


CONSULTA DE INFECIOLOGIA

PrEP

- Durante o período que estiver a fazer PrEP deve **manter sempre seguimento clinico**



ELABORADO PELA EQUIPA MULTIDISCIPLINAR DO
SERVIÇO DE DOENÇAS INFECCIOSAS - CONSULTA
DE IMUNODEPRESSÃO E HOSPITAL DE DIA - CHULN
- HOSPITAL DE SANTA MARIA, EPE

CHULN - HOSPITAL DE SANTA MARIA

SERVIÇO DE DOENÇAS INFECCIOSAS

CONTACTOS

Consulta de Infeciologia PrEP / Hospital
de Dia de Doenças Infecciosas:


sdi@chln.min-saude.pt

217 805 283

Localização e horário de funcionamento

Elevadores: 14 e 15 ou escada - Piso 6

2^a a 6^a feira das 8h00 às 18h00 (dias úteis)



Agosto de 2023

CENTRO HOSPITALAR
LISBOA NORTE, EPE



Av. Prof. Egas Moniz - 1649-035 Lisboa
Telefone: 21 780 50 00
contactcenter@hsm.min-saude.pt
www.chln.min-saude.pt

CENTRO HOSPITALAR
LISBOA NORTE, EPE





PrEP

Profilaxia pré-exposição

O que é?

- PrEP é um método de prevenção da infeção por VIH em pessoas com risco acrescido

Recomendado para:

- Pessoas não infetadas com o VIH, com critérios, tais como:
 - sexo sem preservativo;
 - uso de substâncias psicoativas nas relações sexuais
 - consumo de drogas injetadas;
 - parceiro/a sexual com VIH não tratado;
 - parceiros serodiscordantes em situação de concepção ou gravidez.

Como Tomar a PrEP

De acordo com a indicação do médico assistente, são preconizados dois regimes terapêuticos

Regime diário

ou

Regime intermitente

Efeitos secundários

- Numa fase inicial pode ocorrer náuseas, dores de estômago, alterações intestinais (diarreia por exemplo), dores de cabeça, mas geralmente resolvem espontaneamente nas primeiras semanas

Deve informar os profissionais de saúde que o acompanham se estes ou outros sintomas agravarem ou não desaparecerem

PrEP e outras IST

- A PrEP é mais eficaz quando combinada com o uso do Preservativo



- A PrEP apenas **reduz o risco de adquirir VIH**, mas **não protege** de outras **infeções sexualmente transmissíveis** (IST), como a sífilis, gonorreia, vírus do papiloma humano (HPV)...

- **Contactar o serviço de saúde quando houver sinais ou sintomas**

- feridas genitais
- ardor ao urinar
- corrimento uretral/anal
- febre
- manchas na pele

Antes de cada consulta terá de realizar rastreios para IST e controlo analítico